

სახელმძღვანელო ინსტრუქცია

ვიზანი® 2 მგ ტაბლეტი
მიიღება პერორალურად.

• ***აქტიური ნივთიერება:*** თითოეული ტაბლეტი შეიცავს 2 მგ დიენოგესტს.
• ***დამხმარე ნივთიერებები:*** ლაქტოზას მონოჰიდრატი, სახამებელი, მიკროკრისტალური ცელულოზა, პოვიდონი K 25, ტალკი, კროსპოვიდონი, მაგნიუმის სტეარატი.

მედიკამენტის გამოყენებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ სახელმძღვანელო ინსტრუქცია, რადგან ის შეიცავს თქვენთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

- *შეინახეთ წინამდებარე მომხმარებლის სახელმძღვანელო. შეიძლება დაგჭირდეთ ხელახლა წაკითხვა.*
- *დამატებითი შეკითხვებით გთხოვთ, მიმართოთ თქვენს ექიმს ან ფარმაცევტს.*
- *ეს წამალი დაგენიშნათ პირადად თქვენ, არ მისცეთ ის სხვებს.*
- *ექიმთან ან საავადმყოფოში მისვლისას აცნობეთ თქვენს ექიმს, რომ ამ მედიკამენტს იყენებთ*
- *ზუსტად დაიცავით წინამდებარე ინსტრუქციაში მოცემული მითითებები. არ გამოიყენოთ მაღალი ან დაბალი დოზები, გარდა იმ დოზისა, რომელიც თქვენთვის არის რეკომენდებული.*

<u>წინამდებარე ინსტრუქციაში მოცემულია შემდეგი ინფორმაცია:</u>

1. რა არის ვიზანი® და რისთვის გამოიყენება იგი?
2.რა უნდა იცოდეთ ვიზანის გამოყენებამდე.
3. როგორ გამოვიყენოთ ვიზანი®?
4. რა არის შესაძლო გვერდითი მოვლენები?
5. ვიზანის® შენახვა.

1. რა არის ვიზანი® და რისთვის გამოიყენება იგი?

• ვიზანის® შეფუთვაში შედის 28 ტაბლეტი თეთრი ან მოთეთრო ფერის, მრგვალი, გლუვი, კონუსური რგოლით. თითოეული ტაბლეტი შეიცავს 2 მგ დიენოგესტის აქტიურ ნივთიერებას.
• ვიზანი® არის ჰორმონალური პრეპარატი. მისი აქტიური ნივთიერება, დიენოგესტი, მიეკუთვნება წამლების ჯგუფს, რომელსაც ეწოდება პროგესტოგენები.
• ვიზანი® გამოიყენება იმ მდგომარეობის სამკურნალოდ, რომელსაც ეწოდება ენდომეტრიოზი. ენდომეტრიოზი ეწოდება საშვილოსნოს შიდა ფენის (ენდომეტრიუმის) განთავსებას საშვილოსნოს შიდა ზედაპირის გარდა სხვა ადგილას. საშვილოსნოს შიდა ფენა მენსტრუალური ციკლის განმავლობაში ყოველთვიურად სქელდება და შემდეგ მენსტრუალური სისხლდენის მექანიზმით გამოიდევნება ორგანიზმიდან.
საშვილოსნოს გარეთა მიდამოებში ენდომეტრიუმის ქსოვილი ასევე სქელდება, მაგრამ სისხლდენის პერიოდში შეიძლება არ გამოიდევნოს სხეულიდან და იწვევს ანთებას და ტკივილს იმ ადგილას, სადაც ის მდებარეობს.
ვიზანი® ხელს უშლის ამ ქსოვილის განვითარებას და ამცირებს ტკივილს მენჯის (თეძოს) მიდამოში და მტკივნეული მენსტრუალური სისხლდენის ჩივილებს ენდომეტრიოზის დროს.

ენდომეტრიოზის მკურნალობა გრძელვადიანი პროცესია. ვიზანი® შეიძლება გამოყენებულ იქნას მენსტრუალური სისხლდენის დაწყების პერიოდსა და მის დასრულებამდე (მენოპაუზა) შორის.

2. რა უნდა გაითვალისწინოთ ვიზანის გამოყენებამდე

არ გამოიყენოთ ვიზანი® შემდეგ სიტუაციებში:

• თუ გაქვთ ვენაში კოაგულაციის პრობლემა (ვენური თრომბოემბოლიური დაავადება),
• თუ გქონდათ ან გაქვთ არტერიული ან გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები; მაგალითად. გულის შეტევა, ინსულტი, გულის დაავადება (სტენოკარდია/სისხლის ნაკლებობა გულის კუნთამდე),
• თუ გაქვთ დიაბეტი (დიაბეტი) და სისხლძარღვები დაზიანებულია ამ დაავადების გამო,
• თუ გაქვთ ან გქონდათ ღვიძლის მძიმე დაავადება და თქვენი ღვიძლის ფუნქციის მაჩვენებლები ჯერ არ დაბრუნებულა ნორმას,
• თუ გქონდათ ან ჯერ კიდევ გაქვთ ღვიძლის კეთილთვისებიანი ან ავთვისებიანი სიმსივნე,
• თუ არსებობს სასქესო ჰორმონებზე დამოკიდებული ავთვისებიანი სიმსივნე (მაგ. სარძევე ჯირკვლის კიბო, გენიტალური ორგანოების კიბო),
• თუ გაქვთ დაუდგენელი ვაგინალური სისხლდენა,

• თუ გაქვთ ჰიპერმგრძნობელობა აქტიური ნივთიერების ან ვიზანში® შემავალი რომელიმე დამხმარე ნივთიერების მიმართ.

ვიზანი® სიფრთხილით გამოიყენება შემდეგ სიტუაციებში:
ზოგადი გაფრთხილებები
თუ გჭირდებათ კონტრაცეფცია, უნდა გამოიყენოთ არაჰორმონალური კონტრაცეფცია.

ვიზანით® მკურნალობის დაწყებამდე უნდა დარწმუნდეთ, რომ ორსულად არ ხართ.

თუ რომელიმე ქვემოთ ჩამოთვლილი მდგომარეობა/რისკფაქტორი არსებობს ან გამწვავებულია, ან თუ ის პირველად ხდება, აუცილებლად უნდა აცნობოთ ექიმს.

• თუ გქონდათ ვენაში შედედების პრობლემა (ვენური თრომბოემბოლია), ან თუ თქვენს მშობლებს ან და-ძმებს ჰქონდათ ასეთი დაავადება ადრეულ ასაკში,
• თუ ხანდაზმული ხართ,
• თუ ეწევით,
• თუ გაქვთ სიმსუქნე (გადაჭარბებული სიმსუქნე),
• თუ ოჯახში გაქვთ ძუძუს კიბოს ისტორია,
• თუ გაქვთ მაღალი არტერიული წნევა, ან თუ გაქვთ მაღალი წნევა ვიზანის® გამოყენებისას (ვიზანი® ზოგადად არ მოქმედებს არტერიულ წნევაზე ნორმალური არტერიული წნევის მქონე ქალებში);
• თუ ადრე გქონიათ დეპრესია,
• თუ ვიზანის® გამოყენებისას ღვიძლის დაავადება განვითარდა (ასეთი დაავადების სიმპტომები შეიძლება მოიცავდეს კანის ან თვალების გაყვითლებას, ან ქავილს მთელს სხეულში. ასევე უნდა აცნობოთ ექიმს, თუ გქონიათ ასეთი დაავადება ორსულობის დროს ან ჰორმონალური მედიკამენტების მიღებისას);
• თუ გაქვთ დიაბეტი, განსაკუთრებით თუ გქონდათ გარდამავალი დიაბეტი წინა ორსულობაში;
• თუ „ორსულობის ნიღაბი“ გაჩნდა წინა ორსულობისას (ყავისფერი ლაქები კანზე, განსაკუთრებით სახეზე); ამ მდგომარეობის მქონე ქალებმა ვიზანის® გამოყენებისას თავი აარიდონ მზის ზემოქმედებას;
• თუ ადრე გქონიათ საშვილოსნოსგარე ორსულობა.
• მაღალი არტერიული წნევის მქონე ქალებში ინსულტის (ინსულტის) რისკი შეიძლება ოდნავ გაიზარდოს მხოლოდ პროგესტაგენის შემცველი პრეპარატებით,
• სიტუაციები, რომლებშიც საჭიროა დიდი ხნის განმავლობაში უმოქმედო ყოფნა, მაგ. სერიოზული ოპერაციები, ავარიები, მოტეხილობები და ა.შ. თუ თქვენ გქონიათ მსგავსი მდგომარეობა, უნდა აცნობოთ ექიმს, რომ იყენებთ ვიზანს®, რადგან შეიძლება დაგჭირდეთ ვიზანი®–ს შეწყვეტა (მაგ. ოპერაციამდე მინიმუმ ოთხი კვირით ადრე). თქვენი ექიმი გეტყვით, როდის დაიწყებთ ხელახლა ვიზანი®-ს გამოყენებას. ეს ჩვეულებრივ ხდება ფეხზე დადგომიდან და სრული მობილურობიდან დაახლოებით ორი კვირის შემდეგ.
• თუ ჩაგტარებიათ სერიოზული ოპერაცია, თუ გქონიათ სერიოზული ტრავმა, (ეს სიტუაციები უნდა შეატყობინოთ ექიმს, რადგან ამ შემთხვევებში ინტრავასკულარული კოაგულაციის რისკი უფრო მაღალია),
• ქალებში, რომლებსაც აღენიშნებათ დაზიანებები და სისხლდენა საშვილოსნოში, როგორიცაა მიომა (სისხლდენა შეიძლება გაიზარდოს ვიზანის® გამოყენებისას. თუ სისხლდენა დიდხანს გაგრძელდა, შეიძლება გამოიწვიოს ანემია. ასეთ შემთხვევებში

ექიმმა შეიძლება განიხილოს წამლის შეწყვეტა)
• თუ გაქვთ ტკივილი მუცლის ქვედა ნაწილში; (ეს შეიძლება იყოს საკვერცხეებში კისტის წარმოქმნის ნიშანი).
• ვინაიდან ვიზანი® მოქმედებს ოვულაციაზე, ვიზანი®-ის გამოყენებისას დაორსულების ალბათობა ნაკლები იქნება.
• ვიზანი® არ არის კონტრაცეპტივი (თუ არ გსურთ ორსულობა, გამოიყენეთ პრეზერვატივი ან სხვა კონტრაცეპტული მეთოდები. ვიზანი®-ს მიღებისას არ უნდა გამოიყენოთ ჩასახვის საწინააღმდეგო რაიმე სახის ჰორმონალური მეთოდი (აბი, ინექცია, ინტრაუტერიული სისტემები).
• თუ დაორსულდებით ვიზანის® მიღების დროს, საშვილოსნოსგარე ორსულობის ალბათობა (როდესაც ბავშვი საშვილოსნოს გარეთ ვითარდება) ოდნავ მაღალია (აცნობეთ ექიმს, თუ ადრე გქონდათ საშვილოსნოსგარე ორსულობა ან თუ გქონიათ მილების პრობლემა. თქვენი ექიმი შეაფასებს სიტუაციას და გადაწყვეტს, დაიწყოს თუ არა ვიზანით® თერაპია).
• აცნობეთ ექიმს, თუ გაქვთ აუხსნელი მუცლის ტკივილი.
• ვიზანი®-ის გამოყენებისას შესაძლოა გამოჩნდეს საკვერცხის ფუნქციური კისტა (ბევრი მათგანი უსიმპტომოა, მაგრამ ზოგიერთმა შეიძლება გამოიწვიოს მენჯის ტკივილი. უმეტეს შემთხვევაში, გადიდებული ფოლიკულები სპონტანურად ქრება 2-3 თვის შემდეგ).
• ექიმი ჩაგიტარებთ კვლევას ვიზანი®-ს გამოყენების დაწყებამდე და შემდეგ რეგულარულად მკურნალობის პერიოდში.

თუ ეს მოვლენები აღგენიშნებათ ან აღგენიშნებოდათ თუნდაც წარსულში ნებისმიერ დროს, გთხოვთ, მიმართოთ ექიმს.

ვიზანის გამოყენება საკვებთან და სასმელთან ერთად:
ვიზანი® შეიძლება მიღებულ იქნას უზმოზე ან საკვებთან ერთად. გრეიფრუტის წვენს შეუძლია გაზარდოს სისხლში ჰორმონების დონე.

ორსულობა
მედიკამენტის გამოყენებამდე მიმართეთ თქვენს ექიმს ან ფარმაცევტს.
ვიზანი® არ მიიღება ორსულობის დროს, რადგან ორსულობისას არ არის საჭირო ენდომეტრიოზის მკურნალობა

თუ გეგმავთ დაორსულებას ვიზანის® გამოყენებისას, მიმართეთ ექიმს.

თუ მკურნალობის დროს მიხვდებით, რომ ორსულად ხართ, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს.

ძუძუთი კვება
მედიკამენტის გამოყენებამდე მიმართეთ თქვენს ექიმს ან ფარმაცევტს.
ვიზანი®-ის გამოყენება არ არის რეკომენდებული ძუძუთი კვების დროს.

ავტომანქანებისა და მექანიზმების გამოყენება
დიენოგესტის შემცველი პროდუქტების მომხმარებლებში სატრანსპორტო საშუალებების მართვისა და მექანიზმებთან მუშაობის უნარზე ზემოქმედება არ

დაფიქსირებულა.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ვიზანის® ზოგიერთი ინგრედიენტის შესახებ
შეიცავს ლაქტოზას. თუ ექიმმა გითხრათ, რომ გაქვთ აუტანლობა გარკვეული ტიპის შაქრის მიმართ, ამ სამკურნალო პროდუქტის გამოყენებამდე მიმართეთ ექიმს.

სხვა პრეპარატებთან ერთად გამოყენება
პრეპარატები, რომლებსაც შეუძლიათ შეცვალონ ვიზანის® ეფექტი ერთდროულად გამოყენებისას:
• ეპილეფსიის სამკურნალოდ გამოყენებული მედიკამენტები (მაგ. ფენიტოინი, ბარბიტურატები, პირიმდონი, კარბამაზეპინი, ოქსკარბაზეპინი, ტოპირამატი, ფელბამატი);
• ტუბერკულოზის სამკურნალოდ გამოყენებული მედიკამენტები (მაგ. რიფამპიცინი);
• ზოგიერთი არანუკლეოზიდური ფერმენტის ინჰიბიტორები, რომლებიც გამოიყენება აივ ინფექციისთვის (მაგ. ნევირაპინი);
• გრიზოფულვინი (ანტიბიოტიკის სახეობა);
• მცენარეული წამალი წმ. იოანეს ვორტი.
• ფუნგიციდები (მაგ. კეტოკონაზოლი, იტრაკონაზოლი, ფლუკონაზოლი);
• ანტაციდები (მაგ. ციმეტიდინი);
• მაღალი წნევის სამკურნალო საშუალებები (მაგ. დილთიაზემი, ვერაპამილი);
• ანტიბიოტიკები (მაგ. ერითრომიცინი, კლარითრომიცინი, როქსითრომიცინი);
• პროტეაზას ინჰიბიტორები, რომლებიც გამოიყენება აივ ინფექციისთვის (მაგ. რიტონავირი, საქვინავირი, ინდინავირი, ნელფინავირი);
• ანტიდეპრესანტები (მაგ. ნეფაზოდონი, ფლუვოქსამინი, ფლუოქსეტინი);
• გრეიფრუტის წვენი.

თუ ამჟამად იყენებთ ან ახლახან იყენებდით რეცეპტით ან ურეცეპტოდ გაცემულ მედიკამენტს, გთხოვთ აცნობოთ მათ შესახებ თქვენს ექიმს ან ფარმაცევტს.

3. როგორ გამოვიყენოთ ვიზანი®?
სათანადო გამოყენების ინსტრუქცია და დოზა/სიხშირე მიღებისას:
ყოველთვის მიიღეთ ვიზანი® ზუსტად ისე, როგორც ექიმმა გირჩიათ. თუ არ ხართ დარწმუნებული, უნდა მიმართოთ თქვენს ექიმს ან ფარმაცევტს.

გაითვალისწინეთ ქვემოთ მოცემული რეკომენდაციები; წინააღმდეგ შემთხვევაში, წამალმა შეიძლება არ აჩვენოს თავისი სრული ეფექტი.

დღეში 1 ტაბლეტი უნდა მიიღოთ.

გამოიყენეთ ტაბლეტები მუდმივად, მათ შორის მენსტრუალური სისხლდენის დღეებში. როდესაც ერთი კოლოფი დასრულდება, დაიწყეთ მეორე კოლოფი შეუფერხებლად. ვიზანი® განკუთვნილია ხანგრძლივი გამოყენებისთვის.

მიღების გზა და მეთოდი:
სასურველია, მიიღოთ ვიზანი® დღის ერთსა და იმავე დროს, საჭიროებისამებრ სითხის საკმარისი რაოდენობით. ვიზანი® შეგიძლიათ მიიღოთ მარტო ან საკვებთან

ერთად. ტაბლეტის მიღება შეგიძლიათ დაიწყოთ ციკლის ნებისმიერ დღეს.

სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფი:
გამოყენება ბავშვებში:
არ გამოიყენება მენსტრუაციის დაწყებამდე. მისი გამოყენება პირველი მენსტრუაციის პერიოდიდან 18 წლამდე არ არის შეფასებული.
გამოყენება ხანდაზმულებში:
არ არის შესაფერისი ხანდაზმულებში გამოსაყენებლად.

სპეციალური გამოყენების შემთხვევები:
თირკმლის უკმარისობა:
დოზის კორექცია არ არის საჭირო თირკმლის უკმარისობის მქონე პაციენტებში.
ღვიძლის უკმარისობა: ვიზანი® არ უნდა იქნას გამოყენებული, თუ არსებობს ღვიძლის ადრეული ან არსებული სერიოზული დაავადება.

თუ ფიქრობთ, რომ ვიზანის® ეფექტი ძალიან ძლიერი ან სუსტია, მიმართეთ თქვენს ექიმს ან ფარმაცევტს.

თუ იყენებთ იმაზე მეტ ვიზანს, ვიდრე საჭიროა:
თუ იმაზე მეტი ვიზანი® გამოიყენეთ, ვიდრე უნდა გამოგეყენებინათ, გაესაუბრეთ ექიმს ან ფარმაცევტს.
კვლევების საფუძველზე ჭარბი დოზირებისგან სერიოზული მავნე ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.

თუ დაგავიწყდათ ვიზანი®-ის გამოყენება:
თუ დაგავიწყდათ ერთი ან მეტი ტაბლეტის მიღება, მიიღეთ როგორც კი გაგახსენდებათ. განაგრძეთ მედიკამენტის მიღება ჩვეულ დროს მომდევნო დღეებში. არ მიიღოთ ორი დოზა ერთსა და იმავე დღეს.

რეკომენდაციები კუჭ-ნაწლავის დარღვევების შემთხვევაში:
თუ ვიზანის® მიღებიდან 3-4 საათის განმავლობაში გაქვთ ღებინება ან დიარეა, უნდა მიიღოთ კიდევ ერთი ტაბლეტი რაც შეიძლება მალე.

არ მიიღოთ ორმაგი დოზა გამოტოვებული დოზის ასანაზღაურებლად.

ეფექტები, რომლებიც შეიძლება აღინიშნოს ვიზანით® მკურნალობის შეწყვეტისას:
მკურნალობის შეწყვეტის შემდეგ დაფიქსირდა მხოლოდ მენჯის არეში ტკივილის უმნიშვნელო მატება დაავადების (ენდომეტრიოზის) გამო. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ პრეპარატის მოქმედება მუდმივია მინიმუმ 6 თვის განმავლობაში. მეორეს მხრივ, სისხლდენის ლაბორატორიული ტესტების შედეგები მოკლე დროში შეიცვალა არანამკურნალევ სუბიექტებში.
თუ გაქვთ დამატებითი შეკითხვები ამ მედიკამენტის გამოყენებასთან დაკავშირებით, მიმართეთ თქვენს ექიმს.

3. რა არის შესაძლო გვერდითი მოვლენები?

ისევე როგორც ყველა წამალს, ვიზანსაც® აქვს გვერდითი მოვლენები მის შემადგენლობაში შემავალი ნივთიერებების მიმართ მგრძნობიარე ადამიანებში.

გვერდითი მოვლენები უფრო ხშირია ვიზანის® თერაპიის დაწყებიდან პირველ თვეებში და ჩვეულებრივ ქრება მკურნალობის გაგრძელებით. ასევე შეიძლება გქონდეთ ცვლილებები სისხლდენის სქემაში, მაგ. ლაქების ტიპის სისხლდენა, არარეგულარული სისხლდენა ან მენსტრუაციის არარსებობა.

შესაძლო გვერდითი ეფექტები ჩამოთვლილია ქვემოთ მათი სიხშირის მიხედვით.

გვერდითი ეფექტების სიხშირე:
ძალიან ხშირი (1/10);
ხშირი (1/100-დან <1/10-მდე);
ნაკლებად ხშირი (1/1000-დან <1/100-მდე);
იშვიათი (1/10000-დან <1/1000-მდე);
ძალიან იშვიათი (< 1/10000),
კლინიკური კვლევების მონაცემებზე დაყრდნობით.

სისხლისა და ლიმფური სისტემის დაავადებები
ნაკლებად ხშირი: ანემია

მეტაბოლიზმი და კვების დაავადებები
ხშირი: წონის მომატება
ნაკლებად ხშირი: წონის დაკლება, მადის მომატება.

ფსიქიატრიული დაავადებები
ხშირი: დეპრესიული განწყობა, ძილის დარღვევა, ნერვიულობა, სექსუალური სურვილის დაკარგვა, განწყობის ცვლილებები
ნაკლებად ხშირი: შფოთვა, დეპრესია, განწყობის ცვალებადობა

ნერვული სისტემის დაავადებები
ხშირი: თავის ტკივილი, შაკიკი
ნაკლებად ხშირი: ავტონომიური ნერვული სისტემის არასტაბილურობა (ეს სისტემა აკონტროლებს სხეულის სპონტანურ ფუნქციებს, მაგ. გულისცემა, ოფლიანობა, კუჭ-ნაწლავის მოძრაობები და ა.შ.), ყურადღების დეფიციტი.

თვალის დაავადებები
იშვიათი: თვალის სიმშრალე

ყურის და შიდა ყურის დაავადებები
იშვიათი: ტინიტუსი

გულის დაავადებები
იშვიათი: სისხლის მიმოქცევის სისტემის არასპეციფიკური დარღვევები, პალპიტაცია

სისხლძარღვთა დაავადებები
იშვიათი: ჰიპოტენზია

სუნთქვის, გულმკერდის და შუასაყარის დარღვევები

იშვიათი: ქოშინი

კუჭ-ნაწლავის დაავადებები
ხშირი: გულისრევა, მუცლის ტკივილი, მეტეორიზმი, მუცლის შებერილობა, ღებინება
იშვიათი: დიარეა, ყაბზობა, დისკომფორტი მუცლის არეში, კუჭ-ნაწლავის ანთება, გინგივიტი

კანისა და კანქვეშა ქსოვილის დაავადებები
ხშირი: აკნე, თმის ცვენა
იშვიათი: კანის სიმშრალე, უხვი ოფლიანობა, ქავილი, თმის ზრდა, ფრჩხილების მსხვრევა, ქერტლი, დერმატიტი, თმის არანორმალური ზრდა, ფოტომგრძნობელობის რეაქცია, ფერის შეცვლა

ძვალ-კუნთოვანი, შემაერთებელი ქსოვილისა და ძვლის დაავადებები
ხშირი: ზურგის ტკივილი
იშვიათი: ძვლების ტკივილი, კუნთების სპაზმი, ტკივილი ხელებსა და ფეხებში, სიმძიმე კიდურებში.

თირკმელებისა და საშარდე გზები დაავადებები
იშვიათი: საშარდე გზების ინფექცია

რეპროდუქციული სისტემის და სარძევე ჯირკვლების დაავადებები
ხშირი: მკერდის დისკომფორტი, საკვერცხის ცისტები, საშვილოსნოს/საშოდან სისხლდენა (ლაქების ჩათვლით)
იშვიათი: ვაგინალური სოკო, ვულვოვაგინალური სიმშრალე, გენიტალური გამონადენი, ტკივილი მუცლის ქვედა ნაწილში, ატროფიული ვულვოვაგინიტი, სარძევე ჯირკვლის მასა, მკერდის კისტა, მკერდის შეშუპება.

ზოგადი დარღვევები და წამლის შეყვანის ადგილის გაღიზიანება
ხშირი: დაღლილობა, გაღიზიანებადობა
იშვიათად: შეშუპება

თუ გაქვთ რაიმე გვერდითი მოვლენა, რომელიც არ არის აღნიშნული წინამდებარე ინსტრუქციაში, აცნობეთ თქვენს ექიმს ან ფარმაცევტს.

5. ვიზანის® შენახვა
შეინახეთ ვიზანი® ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას მისსავე შეფუთვაში.
ინახება ოთახის ტემპერატურაზე 30oC-ზე დაბალ ტემპერატურაზე.

გამოიყენეთ ვარგისიანობის ვადების შესაბამისად.
არ გამოიყენოთ ვიზანი® შეფუთვაზე მითითებული ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ.

არ გამოიყენოთ ვიზანი®, თუ შეამჩნევთ რაიმე დეფექტს პროდუქტში ან/და მის შეფუთვაში.

ლიცენზიის მფლობელი:

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. Çakmak Mah. Balkan Cad. No:5334770 Ümraniye - სტამბოლი

მწარმოებელი:
Schering GmbH und co. Produktions KG, ვაიმარი-გერმანია