

სახელმძღვანელო ინსტრუქცია

AKNETRENT® 20 მგ რბილი ჟელატინის კაფსულა

მიიღება პერორალურად.

გაფრთხილება

მედიკამენტმა შეიძლება სერიოზული ზიანი მიაყენოს მუცლად მყოფ ბავშვს.

ქალებმა უნდა გამოიყენონ ეფექტური ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები.

არ მიიღოთ მედიკამენტი, თუ ორსულად ხართ ან ფიქრობთ, რომ ორსულად ხართ.

▼ აღნიშნული პრეპარატი ექვემდებარება დამატებით მონიტორინგს. ეს სამკუთხედი შესაძლებელს გახდის უსაფრთხოების ახალი ინფორმაციის სწრაფ იდენტიფიკაციას. თქვენ შეგიძლიათ დაეხმაროთ კვლევას ნებისმიერი გვერდითი ეფექტის შესახებ შეტყობინებით. გვერდითი ეფექტების შესახებ ინფორმაციისთვის იხილეთ მე-4 ნაწილი.

აქტიური ნივთიერება: იზოტრეტინოინი.

• ***დამხმარე ნივთიერებები:*** რაფინირებული სოიოს ზეთი, ყვითელი ფუტკრის ცვილი, ჰიდროგენირებული სოიოს ზეთი, ნაწილობრივ ჰიდროგენირებული სოიოს ზეთი, ჟელატინი (ძროხის ჟელატინი), გლიცერინი, ტიტანის დიოქსიდი (E 171), რკინის წითელი ოქსიდი (E 172), რკინის ყვითელი ოქსიდი (E 172)

მედიკამენტის გამოყენებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ სახელმძღვანელო ინსტრუქცია, რადგან ის შეიცავს თქვენთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

- *შეინახეთ წინამდებარე მომხმარებლის სახელმძღვანელო. შეიძლება დაგჭირდეთ ხელახლა წაკითხვა.*
- *დამატებითი შეკითხვებით გთხოვთ, მიმართოთ თქვენს ექიმს ან ფარმაცევტს.*
- *ეს წამალი დაგენიშნათ პირადად თქვენ, არ მისცეთ ის სხვებს.*
- *ექიმთან ან საავადმყოფოში მისვლისას აცნობეთ თქვენს ექიმს, რომ ამ მედიკამენტს იყენებთ*
- *ზუსტად დაიცავით წინამდებარე ინსტრუქციაში მოცემული მითითებები. არ გამოიყენოთ მაღალი ან დაბალი დოზები, გარდა იმ დოზისა, რომელიც თქვენთვის არის რეკომენდებული.*

წინამდებარე სახელმძღვანელო ინსტრუქციაში მოცემულია შემდეგი ინფორმაცია:

1. რა არის აკნეტრენტი® და რისთვის გამოიყენება იგი?
2. რა უნდა გაითვალისწინოთ აკნეტრენტის® გამოყენებამდე
3. როგორ გამოვიყენოთ აკნეტრენტი®?
4. რა არის შესაძლო გვერდითი მოვლენები?
5. აკნეტრენტის® შენახვა

რა არის აკნეტრენტი® და რისთვის გამოიყენება იგი?

- აკნეტრენტი შეიცავს იზოტრეტინოინს, როგორც აქტიურ ინგრედიენტს, რომელიც დაკავშირებულია A ვიტამინთან და მიეკუთვნება რეტინოიდების ჯგუფს.
- აკნეტრენტის თითოეული შეფუთვა შეიცავს 30 რბილ ჟელატინის კაფსულას (PVC/PE/PVDC/Alu) 10 კაფსულიან ორმაგ ბლისტერში. კაფსულები არის ოვალური, წითელი-ნარინჯისფერი ფერის.
- აკნეტრენტი, მძიმე ტიპის აკნეს დროს [მაგ; იგი გამოიყენება სიმსივნური (კვანძოვანი), მრგვალი (კონგლობული) აკნეს ან აკნეს სამკურნალოდ მუდმივი ნაწიბურების რისკის შემთხვევაში. აკნეტრენტს მიიღებთ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი მდგომარეობა არ გაუმჯობესდება აკნეს საწინააღმდეგო საშუალებებით, მათ შორის ანტიბიოტიკებითა და კანის პროცედურებით.
- აკნეტრენტით მკურნალობა უნდა ჩატარდეს დერმატოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ (ექიმი, რომელიც სპეციალიზირებულია კანის პრობლემების მკურნალობაში).

2. რა უნდა გაითვალისწინოთ აკნეტრენტის® გამოყენებამდე

არ გამოიყენოთ აკნეტრენტი® შემდეგ სიტუაციებში

• თუ ხართ ორსულად ან ძუძუთი კვებავთ
• თუ ფიქრობთ, რომ ორსულად ხართ.
• თუ გეგმავთ დაორსულებას
• თუ არსებობს თქვენი დაორსულების ალბათობა, უნდა დაიცვათ სიფრთხილის ზომები „ორსულობის პრევენციის პროგრამის“ მიხედვით, იხილეთ ორსულობის პრევენციის

პროგრამა. პუნქტი "გაფრთხილებები და სიფრთხილის ზომები".
• თუ ხართ ალერგიული (ჰიპერმგრძნობიარე) სოიოს ან აკნეტრენტის რომელიმე დამხმარე ნივთიერების მიმართ. ეს წამალი შეიცავს სოიოს ზეთს, ასევე იზოტრეტინოინს. ამიტომ, აკნეტრენტი არ უნდა იქნას გამოყენებული სოიოს მიმართ ალერგიის მქონე პაციენტებში.
• თუ გაქვთ ღვიძლის დაავადება.
• თუ გაქვთ სისხლში ცხიმის ძალიან მაღალი დონე (მაგ. მაღალი ქოლესტერინი ან ტრიგლიცერიდები)
• თუ გაქვთ ორგანიზმში A ვიტამინის ძალიან მაღალი შემცველობა (ჰიპერვიტამინოზი A)
• არ გამოიყენოთ 12 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის. 12 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებში გამოიყენება მხოლოდ მაშინ, თუ მათ უკვე მიაღწიეს პუბერტატს.
• თუ თქვენ მკურნალობთ ტეტრაციკლინებით (ანტიბიოტიკის ტიპი) („სხვა პრეპარატებთან ერთად (იხილეთ პუნქტი „ერთად გამოყენება“)

ორსულობის პრევენციის პროგრამა

ორსულებმა არ უნდა გამოიყენონ აკნეტრენტი

ამ წამალმა შეიძლება სერიოზული ზიანი მიაყენოს მუცლად მყოფ ბავშვს (მედიკამენტი ცნობილია როგორც "ტერატოგენული") - შეიძლება გამოიწვიოს მუცლად მყოფი ბავშვის ტვინის, სახის, ყურის, თვალების, გულის და ზოგიერთი ჯირკვლის სერიოზული დარღვევები (თიმუსის ჯირკვალი და პარათირეოიდული ჯირკვალი). ის ასევე ზრდის მუცლის მოშლის რისკს. ეს შეიძლება მოხდეს მაშინაც კი, თუ აკნეტრენტი მიიღება მხოლოდ მცირე ხნით ორსულობის დროს.

- არ მიიღოთ აკნეტრენტი, თუ ორსულად ხართ ან ფიქრობთ, რომ ორსულად ხართ;
- არ გამოიყენოთ აკნეტრენტი, თუ ძუძუთი კვებავთ. არსებობს შესაძლებლობა, რომ ეს წამალი გადავიდეს თქვენს რძეში და ზიანი მიაყენოს თქვენს პატარას.
- არ გამოიყენოთ აკნეტრენტი, თუ მკურნალობის პერიოდში სავარაუდოა, რომ დაორსულდებით.
- არ დაორსულდეთ მკურნალობის შეწყვეტიდან ერთი თვის განმავლობაში, რადგან შესაძლოა თქვენს ორგანიზმში კვლავ დარჩენილი იყოს წამალი.

აკნეტრენტი ინიშნება მკაცრი მითითებების დაცვით იმ ქალების შემთხვევაში, რომლებიც შეიძლება დაორსულდნენ. ეს გამოწვეულია მუცლად მყოფი ბავშვისთვის სერიოზული ზიანის რისკის გამო.

ეს მითითებებია:

- თქვენი ექიმი ვალდებულია, აგიხსნათ მუცლად მყოფი ბავშვისთვის ზიანის მიყენების რისკი - უნდა იცოდეთ რატომ არ უნდა დაორსულდეთ და რა უნდა გააკეთოთ ორსულობის თავიდან ასაცილებლად.
- უნდა განიხილოთ კონტრაცეფცია (ჩასახვის კონტროლი) ექიმთან. ექიმი მოგცემთ ინფორმაციას ორსულობის პრევენციის შესახებ. მას შეუძლია გადაგამისამართოთ სპეციალისტთან, რომელიც მოგცემთ რჩევას ჩასახვის საწინააღმდეგო მეთოდების შესახებ.
- მკურნალობის დაწყებამდე ექიმი მოგთხოვთ ორსულობის ტესტის ჩატარებას. ამ ტესტმა უნდა აჩვენოს, რომ არ ხართ ორსულად აკნეტრენტით მკურნალობის დაწყებისას.

ქალებმა უნდა გამოიყენონ ეფექტური კონტრაცეფცია აკნეტრენტის გამოყენების წინ, მისი მიღების დროს და მის შემდეგ.

- თქვენ უნდა დათანხმდეთ კონტრაცეფციის მინიმუმ ერთი ძალიან საიმედო მეთოდის გამოყენებაზე (მაგალითად, საშვილოსნოსშიდა მოწყობილობა ან კონტრაცეპტული იმპლანტი) ან ორი ეფექტური მეთოდი, რომლებიც მოქმედებს სხვადასხვა გზით (მაგალითად, ჰორმონალური კონტრაცეპტული აბი და პრეზერვატივი). ესაუბრეთ ექიმს იმის შესახებ, თუ რომელი მეთოდები იქნება თქვენთვის შესაფერისი.
- კონტრაცეფცია უნდა გამოიყენოთ აკნეტრენტით მკურნალობის დაწყებამდე 1 თვით ადრე, მკურნალობის დროს და მკურნალობის დასრულებიდან 1 თვის განმავლობაში.
- გამოიყენეთ კონტრაცეფცია მაშინაც კი, თუ არ გაქვთ მენსტრუაცია ან არ ხართ სექსუალურად აქტიური (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ თქვენი ექიმი გადაწყვეტს, რომ ეს არ არის აუცილებელი).

ქალები უნდა დათანხმდნენ ორსულობის ტესტის ჩატარებაზე აკნეტრენტის გამოყენებამდე, გამოყენების დროს და მის შემდეგ.

- მკურნალობის შემდგომი დაკვირვებისთვის რეგულარულად უნდა მიმართოთ ექიმს, სასურველია ყოველთვიურად.
- უნდა დათანხმდეთ ორსულობის ტესტების ჩატარებას რეგულარულად, სასურველია ყოველთვიურად მკურნალობის პერიოდში და 1 თვის შემდეგ აკნეტრენტის მიღების შეწყვეტიდან, რადგან წამლის ნაწილი შეიძლება კვლავ დარჩეს თქვენს ორგანიზმში (თუ ექიმი არ გადაწყვეტს, რომ ეს არ არის საჭირო თქვენთვის).
- აუცილებელია, დათანხმდეთ ორსულობის დამატებით ტესტებს, თუ ამას თქვენი ექიმი მოგთხოვთ.
- არ უნდა დაორსულდეთ მკურნალობის დროს ან მას შემდეგ ერთი თვის განმავლობაში, რადგან შესაძლოა თქვენს სხეულში კვლავ დარჩენილი იყოს წამალი.
- ექიმი თქვენთან ერთად განიხილავს ყველა ამ სიტუაციას საკონტროლო სიის გამოყენებით და მოგთხოვთ თქვენ (ან მშობელს/მეურვეს) ხელი მოაწეროთ მას. აღნიშნული ფორმა ადასტურებს, რომ გაგაფრთხილეს რისკების შესახებ და თანახმა ხართ, რომ დაიცავთ ზემოთ მოცემულ წესებს.

თუ დაორსულდებით აკნეტრენტის გამოყენებისას, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ პრეპარატის გამოყენება და მიმართეთ თქვენს ექიმს. ექიმმა შეიძლება გადაგამისამართოთ სპეციალისტთან საჭირო რჩევისთვის.

ასევე, თუ დაორსულდებით აკნეტრენტის გამოყენების შეწყვეტიდან ერთი თვის განმავლობაში, უნდა მიმართოთ ექიმს. ექიმმა შეიძლება გადაგამისამართოთ სპეციალისტთან საჭირო რჩევისთვის.

თქვენი ექიმის ფლობს წერილობით ინფორმაციას აკნეტრენტის მომხმარებლების ორსულობის პრევენციის შესახებ. ის ვალდებულია, მოგაწოდოთ ეს ინფორმაცია.

რეკომენდაციები მამაკაცებისთვის

ორალური რეტინოიდების დონე მამაკაცების სპერმაში, რომლებიც იღებენ აკნეტრენტს, საკმარისად დაბალია, რომ არ დააზიანოს მათი პარტნიორის მუცლად მყოფი ბავშვი. თუმცა, არასოდეს არ უნდა გაუზიაროთ თქვენი წამალი ვინმეს.

დამატებითი სიფრთხილის ზომები

არასოდეს არ მისცეთ ეს წამალი სხვა ადამიანს. გთხოვთ ყველა გამოუყენებელი კაფსულა მიაწოდოთ თქვენს ფარმაცევტს მკურნალობის ბოლოს.

არ უნდა გაიღოთ სისხლი აკნეტრენტით მკურნალობის დროს და მკურნალობის შეწყვეტიდან 1 თვის განმავლობაში. იმ შემთხვევაში, რომ ორსული პაციენტი მიიღებს თქვენს სისხლს, შეიძლება ზიანი მიადგეს მის მუცლად მყოფ ბავშვს.

ორსულობა, ლაქტაცია და ნაყოფიერება

ორსულობისა და კონტრაცეფციის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ თავი 2 „კონტრაცეფციის პროგრამა“.

აკნეტრენტი® სიფრთხილით გამოიყენება შემდეგ შემთხვევებში:

თუ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელიმე თქვენც გეხებათ, მიმართეთ ექიმს აკნეტრენტის გამოყენებამდე.

აკნეტრენტის გამოყენებამდე გაესაუბრეთ ექიმს:

- დეპრესია, აგრესიული ტენდენციები ან განწყობის ცვლილება; ასევე, თუ ოდესმე გქონიათ რაიმე ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, მათ შორის საკუთარი თავის ზიანის მიყენების ან სიცოცხლის დასრულების აზრები.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები

თქვენ შეიძლება ვერ შეამჩნიოთ ცვლილებები თქვენს განწყობასა და ქცევაში, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უთხრათ თქვენს მეგობრებსა და ოჯახის წევრებს, რომ ამ წამალმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს თქვენს განწყობასა და ქცევაზე. მათ შეუძლიათ შეამჩნიონ ეს ცვლილებები და დაგეხმარონ ისეთი საკითხების ამოცნობაში, რომლებზეც უნდა ესაუბროთ ექიმს.

რჩევა ყველა პაციენტისთვის

- **აცნობეთ ექიმს, თუ ოდესმე გქონიათ ფსიქიკური დაავადება** (დეპრესია, სუიციდური ქცევა ან ფსიქოზი) ან თუ იღებთ მედიკამენტებს ამ დაავადებებისთვის.
- **აკნეტრენტის გამოყენებისას დაფიქსირდა კანის მძიმე რეაქციები** (მაგ., მულტიფორმული ერითემა, სტივენს-ჯონსონის სინდრომი და ტოქსიკური ეპიდერმული ნეკროლიზი). გამონაყარი შეიძლება პროგრესირდეს და გამოიწვიოს კანის ბუშტუკები ან აქერცვლა. ასევე შეამოწმეთ წყლულები ან თვალის ინფექციები (თვალების სიწითლე და შეშუპება) პირის ღრუში, ცხვირსა და სასქესო ორგანოების მიდამოში.
- **აკნეტრენტმა იშვიათად შეიძლება გამოიწვიოს მძიმე ალერგიული რეაქციები,** რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს კანზე ეგზემის, ჭინჭრის ციების, სისხლჩაქცევების ან წითელი ლაქების სახით ხელებსა და ფეხებზე. ალერგიული რეაქციის განვითარების შემთხვევაში, შეწყვიტეთ აკნეტრენტის გამოყენება, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს და აცნობეთ, რომ იყენებთ ამ მედიკამენტს.
- **გამორიცხეთ მძიმე ვარჯიში და ფიზიკური დატვირთვა.** აკნეტრენტმა შეიძლება გამოიწვიოს კუნთებისა და სახსრების ტკივილი, განსაკუთრებით ბავშვებში და მოზარდებში, რომლებიც ენერგიულ ფიზიკურ აქტივობას ეწევიან.
- **აკნეტრენტი დაკავშირებულია ნაწლავის ანთებით დაავადებასთან.** თუ თქვენ გაქვთ მძიმე სისხლიანი ფაღარათი კუჭ-ნაწლავის დაავადების ისტორიის გარეშე, თქვენი ექიმი მიიღებს გადაწყვეტილებას, შეწყვიტოს აკნეტრენტით მკურნალობა.
- **აკნეტრენტმა შეიძლება გამოიწვიოს მხედველობის გაძნელება,** როგორიცაა თვალების სიმშრალე, კონტაქტური ლინზების აუტანლობა და ღამის ხედვის შემცირება. თუ თქვენ გაქვთ რომელიმე ამ სიმპტომიდან, აცნობეთ ექიმს. ექიმმა შეიძლება გირჩიოთ, გამოიყენოთ საპოხი თვალის მალამო ან ხელოვნური ცრემლის თერაპია. თუ ატარებთ კონტაქტურ ლინზებს და შეამჩნევთ, რომ განვითარდა კონტაქტური ლინზების აუტანლობა, ექიმმა შეიძლება გირჩიოთ სათვალეების ტარება მკურნალობის დროს. მხედველობის პრობლემების გამოვლენის შემთხვევაში ექიმმა შეიძლება გადაგამისამართოთ სპეციალისტთან და შეიძლება მოგთხოვოთ შეწყვიტოთ ანკეკრენტის გამოყენება.
- **აღინიშნა კეთილთვისებიანი ინტრაკრანიალური არტერიული წნევის მომატება** აკნეტრენტის გამოყენების გამო და ზოგიერთ შემთხვევაში ტეტრაციკლინებთან ერთად გამოყენებისას (ანტიბიოტიკის ტიპი). თუ შეამჩნევთ, რომ ვითარდება ისეთი სიმპტომები, როგორიცაა თავის ტკივილი, გულისრევა, ღებინება და მხედველობის დარღვევა, შეწყვიტეთ აკნეტრენტის გამოყენება და სასწრაფოდ მიმართეთ ექიმს. ექიმმა შეიძლება გადაგამისამართოთ სპეციალისტთან თვალის ოპტიკური დისკის შეშუპების შესამოწმებლად (პაპილედემა).
- **აკნეტრენტს შეუძლია გაზარდოს ღვიძლის ფერმენტების დონე.** ექიმი ჩაგიტარებთ სისხლის ანალიზს ამ მაჩვენებლების შესამოწმებლად აკნეტრენტით მკურნალობის დაწყებამდე და მის შემდეგ. თუ აღნიშნული მაჩვენებლები გაიზრდება, ექიმმა შეიძლება შეამციროს თქვენი დოზა ან შეწყვიტოს აკნეტრენტით თქვენი მკურნალობა.

- **აკნეტრენტი ჩვეულებრივ ზრდის სისხლში ცხიმებს,** როგორიცაა ქოლესტერინი ან ტრიგლიცერიდები. ექიმი შეამოწმებს ამ მაჩვენებლებს თქვენს მიერ აკნეტრენტით მკურნალობის დაწყებამდე და მის შემდეგ. რეკომენდირებულია, რომ არ დალიოთ ალკოჰოლი მკურნალობის დროს ან მინიმუმ შეამციროთ ჩვეულებრივ მოხმარების რაოდენობა. აცნობეთ ექიმს, თუ უკვე გაქვთ სისხლში ცხიმების მატება, დიაბეტი (სისხლში შაქრის მომატება), წონის მომატება ან ალკოჰოლთან დაკავშირებული პრობლემები. შესაძლოა უფრო ხშირად დაგჭირდეთ სისხლის ანალიზის გაკეთება. თუ სისხლში ცხიმები რჩება მაღალ ნიშნულზე, ექიმმა შეიძლება შეამციროს თქვენი დოზა ან შეწყვიტოს თქვენი აკნეკრენტით მკურნალობა.
- **აცნობეთ ექიმს თუ გაქვთ თირკმელების პრობლემა.** ექიმმა შეიძლება დაიწყოს თქვენი აკნეტრენტით მკურნალობა შედარებით დაბალი დოზით და შემდეგ გაზარდოს ის მაქსიმუმამდე, რომლის ატანაც შეგიძლიათ.
- **აკნეტრენტს შეუძლია გაზარდოს შაქრის დონე სისხლში.** იშვიათ შემთხვევებში პაციენტები შეიძლება იყვნენ დიაბეტიკები. ექიმმა შეიძლება აკონტროლოს თქვენი სისხლში შაქრის დონე მკურნალობის დროს, განსაკუთრებით თუ უკვე გაქვთ დიაბეტი, გაქვთ ჭარბი წონა ან ხართ ალკოჰოლიკი.
- **თქვენი კანი შეიძლება გამოშრეს.** მკურნალობის დროს გამოიყენეთ კანის დამატენიანებელი მალამო ან კრემი და ტუჩის ბალზამი. არ გამოიყენოთ ამქრცლავი ან აკნეს საწინააღმდეგო საშუალებები კანის გაღიზიანების თავიდან ასაცილებლად.
- **მოერიდეთ ზედმეტ მზეს და არ გამოიყენოთ სოლარიუმი.** თქვენი კანი შეიძლება უფრო მგრძნობიარე იყოს მზის სხივების მიმართ. მზეზე გასვლამდე გამოიყენეთ მზისგან დამცავი საშუალება მაღალი დამცავი ფაქტორით (SPF 15 ან მეტი).
- **არ ჩაიტაროთ კანის მოვლის კოსმეტიკური პროცედურები.** აკნეტრენტს შეუძლია თქვენი კანი უფრო მგრძნობიარე გახადოს. არ გაიკეთოთ ეპილაცია (თმის მოცილება), დერმაბრაზია (ლაქების ან ხალების მოცილება) ან ლაზერული მკურნალობა (გაღიზიანების ან ნაწიბურების მოცილება) მკურნალობის დასრულებიდან სულ მცირე 6 თვემდე. ამ პროცედურებმა შეიძლება გამოიწვიოს ნაწიბურები, კანის გაღიზიანება ან იშვიათ შემთხვევებში კანის ფერის შეცვლა.

თუ ზემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელიმე მდგომარეობა აღგენიშნებათ ამ წარსულში აღგენიშნებოდათ, მიმართეთ ექიმს.

აკნეტრენტის® გამოყენება საკვებთან და სასმელთან ერთად

ჩვეულებრივ შეგიძლიათ მიიღოთ საკვები და სასმელი აკნეტრენტის გამოყენებისას.
კაფსულები მიიღება პერორალურად, სავსე კუჭზე.

ორსულობა

მედიკამენტის გამოყენებამდე მიმართეთ თქვენს ექიმს ან ფარმაცევტს.
არ გამოიყენოთ აკნეტრენტი, თუ ხართ ორსულად ან გეგმავთ დაორსულებას. თქვენს ექიმს

შეუძლია მოგაწოდოთ მეტი ინფორმაცია.
ორსულობისა და კონტრაცეფციის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ თავი 2 „ორსულობა და პრევენციის პროგრამა“.
თუ მკურნალობის დროს მიხვდებით, რომ ორსულად ხართ, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს.

ძუძუთი კვება
არ გამოიყენოთ აკნეტრენტი, თუ ძუძუთი კვებავთ ბავშვს. თქვენს ექიმს შეუძლია მოგაწოდოთ მეტი ინფორმაცია.
ედიკამენტის გამოყენებამდე მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს.

ავტომანქანების და მექანიზმების მართვა
მკურნალობის დროს შეიძლება ღამით კარგად ვერ დაინახოთ. ეს შეიძლება მოულოდნელად მოხდეს. იშვიათ შემთხვევებში ეს გრძელდება მკურნალობის შეწყვეტის შემდეგაც. ძალიან იშვიათად აღინიშნა დაღლილობა და თავბრუსხვევა. ამ გვერდითი ეფექტების გამოვლების შემთხვევაში ნუ მართავთ ავტომანქანას და ნუ გამოიყენებთ მექანიზმებს.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ზოგიერთი დამხმარე ნივთიერების შესახებ აკნეტრენტი® შეიცავს სოიოს ზეთს. არ გამოიყენოთ ეს სამკურნალო პროდუქტი, თუ ალერგიული ხართ არაქისის ან სოიოს მიმართ.

სხვა პრეპარატებთან ერთად გამოყენება
- აკნეტრენტის გამოყენებისას არ მიიღოთ A ვიტამინის დანამატები ან ტეტრაციკლინები (ანტიბიოტიკის ტიპი) და არ ჩაიტაროთ აკნეს საწინააღმდეგო რაიმე სახის მკურნალობა კანზე. შეგიძლიათ გამოიყენოთ დამატენიანებელი და დამარბილებელი საშუალებები (კანის კრემები და პრეპარატები, რომლებიც ხელს უშლის წყლის დაკარგვას და კანს რბილს ხდის).
- აკნეტრენტის გამოყენებისას მოერიდეთ ადგილობრივი კერატოლიზური ან ამქერცლავი, აკნეს საწინააღმდეგო საშუალებების გამოყენებას.

თუ ამჟამად იყენებთ ან ცოტა ხნის წინ იყენებდით რეცეპტით ან ურეცეპტოდ გაცემულ მედიკამენტს, გთხოვთ აცნობოთ მათ შესახებ თქვენს ექიმს ან ფარმაცევტს.

გამოყენება ბავშვებში და მოზარდებში
არ გამოიყენოთ აკნეტრენტი 12 წლამდე ასაკის ბავშვებში, რადგან უცნობია, უსაფრთხოა თუ ეფექტური ამ ასაკობრივ ჯგუფში. 12 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებში მისი გამოყენება უნდა მოხდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მათ უკვე მიაღწიეს პუბერტატს.

1. როგორ გამოვიყენოთ აკნეტრენტი®?

ყოველთვის მიიღეთ აკნეტრენტი ზუსტად ისე, როგორც ექიმმა გითხრათ. თუ არ ხართ დარწმუნებული, მიმართეთ თქვენს ექიმს ან ფარმაცევტს.

ინსტრუქციები სათანადო გამოყენებისა და დოზის/მიღების სიხშირის შესახებ

- ჩვეულებრივი საწყისი დოზაა 0,5 მგ დღეში (0,5 მგ/კგ/დღეში) სხეულის მასაზე (კგ).

მაგალითად; თუ თქვენი წონაა 70 კგ, მკურნალობას დაიწყებთ დღეში 35 მგ დოზით.

- მიიღეთ კაფსულები დღეში ერთხელ ან ორჯერ ჭამის შემდეგ.
- რამდენიმე კვირის შემდეგ ექიმმა შეიძლება შეცვალოს თქვენი წამლის დოზა. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ მიიღებს თქვენი ორგანიზმი წამალს. პაციენტების უმეტესობისთვის დოზა იქნება 0,5-დან 1,0 მგ/კგ/დღეში.
- მკურნალობა ჩვეულებრივ გრძელდება 16-დან 24 კვირამდე. პაციენტების უმეტესობისთვის 1 მკურნალობის პერიოდი საკმარისია. თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა შესაძლოა გაუმჯობესდეს მკურნალობის დასრულებიდან 8 კვირამდე პერიოდში. ამ დროის განმავლობაში არ დაიწყოთ ახალი მკურნალობა.

- ზოგიერთი პაციენტი აღმოაჩენს, რომ მათი აკნეს მდგომარეობა უარესდება მკურნალობის პირველი კვირების განმავლობაში. თუმცა, ეს სიტუაცია უმჯობესდება მკურნალობის გაგრძელებისას.

მიღების გზა და მეთოდი

კაფსულები მიიღება პერორალურად, სავსე კუჭზე. გადაყლაპეთ მთლიანად, მიიღეთ სასმელთან ან საკვებთან ერთად.

მერცხალი.

სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფი

გამოყენება ბავშვებში

არ გამოიყენოთ აკნეტრენტი 12 წლამდე ასაკის ბავშვებში. გამოიყენება მხოლოდ 12 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებისთვის, რომლებმაც მიაღწიეს პუბერტატს. ამ ჯგუფისთვის დოზის სპეციფიკური კორექტირება არ არსებობს.

გამოყენება ხანდაზმულებში:

ხანდაზმულ პაციენტებში დოზის კორექცია საჭირო არ არის.

სპეციალური გამოყენების შემთხვევები

თირკმლის უკმარისობა

თუ გაქვთ თირკმელების სერიოზული პრობლემები, ჩვეულებრივ დაიწყებთ დაბალი დოზით (როგორიცაა 10 მგ დღეში), რომელიც შემდეგ გაიზრდება მაქსიმალურ დოზამდე, რომლის ატანასაც თქვენი ორგანიზმი შეძლებს. თუ თქვენი ორგანიზმი ვერ იტანს

რეკომენდებულ დოზას, შეიძლება დაგინიშნოთ უფრო დაბალი დოზა; ამიტომ, შესაძლოა მკურნალობა გაცილებით დიდი ხნის განმავლობაში მოგიწიოთ და აკნე შეიძლება განმეორდეს.

ღვიძლის უკმარისობა
აკნეტრენტი არ უნდა იქნას გამოყენებული ღვიძლის უკმარისობის შემთხვევაში. თუ ექიმი სხვაგვარ რჩევებს არ მოგცემთ, მიჰყევით ამ მითითებებს. არ დაგავიწყდეთ მედიკამენტების დროულად მიღება.
ექიმი გაცნობებთ, რამდენ ხანს გაგრძელდება აკნეტრენტით თქვენი მკურნალობა. არ შეწყვიტოთ მკურნალობა ნაადრევად, რადგან სასურველ შედეგს ვერ მიიღებთ.

თუ ფიქრობთ, რომ აკნეტრენტის ეფექტი ძალიან ძლიერი ან სუსტია, მიმართეთ თქვენს ექიმს ან ფარმაცევტს.

საჭიროზე დიდი დოზის აკნეტრენტის® მიღება
საჭიროზე დიდი დოზის აკნეტრენტის® მიღების შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს.

თუ დაგავიწყდათ აკნეტრენტის® მიღება
თუ დაგავიწყდათ აკნეტრენტის® მიღება, მიიღეთ გამოტოვებული დოზა რაც შეიძლება მალე. თუმცა, თუ შეამჩნევთ, რომ დაგავიწყდათ დოზის მიღება და მოახლოვებულია მომდევნო დოზის მიღების დრო, არ მიიღოთ გამოტოვებული დოზა და გააგრძელეთ მომდევნო დოზით.
არ მიიღოთ ორმაგი დოზა (ორივე დოზა ერთმანეთთან ახლოს) გამოტოვებული დოზის ასანაზღაურებლად.

უცნობია ეფექტები, რომლებიც შეიძლება განვითარდეს აკნეტრენტით® მკურნალობის შეწყვეტისას.

1. რა არის შესაძლო გვერდითი მოვლენები?
ყველა მედიკამენტის მსგავსად, შეიძლება დაფიქსირდეს გვერდითი მოვლენები ადამიანებში, რომლებიც მგრძნობიარენი არიან აკნეტრენტის ინგრედიენტების მიმართ. ზოგიერთი გვერდითი მოვლენა შეიძლება იყოს სერიოზული და გამოიწვიოს ჰოსპიტალიზაცია.

თუ ჩამოთვლილთაგან რომელიმე მოვლენა აღგენიშნებათ, შეწყვიტეთ აკნეყტრენტის® გამოყენება და დაუყოვნებლივ აცნობეთ ექიმს ან მიმართეთ უახლოეს საავადმყოფოს გადაუდებელი დახმარების განყოფილებას:
• მძიმე (ანაფილაქსიური) რეაქციები: სუნთქვისა და ყლაპვის გაძნელება ყელის, სახის, ტუჩების და პირის უეცარი შეშუპებით. ასევე ხელების, ფეხების და ტერფების უეცარი შეშუპება.

ეს ყველაფერი ძალიან სერიოზული გვერდითი მოვლენებია. თუ ერთ-ერთი ასეთი მოვლენა განგივითარდათ, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ გაქვთ სერიოზული ალერგია აკნეტრენტზე. შეიძლება დაგჭირდეთ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება ან ჰოსპიტალიზაცია.

გვერდითი მოვლენები კლასიფიცირებულია შემდეგ კატეგორიებში:
ძალიან ხშირი: შეიძლება დაფიქსირდეს 10-დან 1 პაციენტში მაინც.
ხშირი: 1-ზე ნაკლები 10 პაციენტიდან, მაგრამ 1-ზე მეტი 100 პაციენტში.
ნაკლებად ხშირი: 1-ზე ნაკლები 100 პაციენტში, მაგრამ 1-ზე მეტი 1000 პაციენტში.
იშვიათი: 1-ზე ნაკლები 1000 პაციენტში, მაგრამ 1-ზე მეტი 10000 პაციენტში .
ძალიან იშვიათი: 1-ზე ნაკლები 10000 პაციენტში.
უცნობია: შეუძლებელია შეფასდეს არსებული მონაცემებით.

გვერდითი მოვლენები, რომლებიც საჭიროებენ სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას
კანის პრობლემები
კანის სერიოზული გამონაყარი (ერითემა მულტიფორმული, სტივენს-ჯონსონის სინდრომი და ტოქსიკური ეპიდერმული ნეკროლიზი), რომლებიც პოტენციურად სიცოცხლისთვის საშიშია და საჭიროებს სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას. ეს პირველად ჩნდება წრიული ლაქების სახით, ბუშტუკებით ცენტრში, ჩვეულებრივ მკლავებზე და ფეხებზე ან ფეხებზე, უფრო მძიმე გამონაყარით, მათ შორის ბუშტუკები მკერდზე და ზურგზე. დამატებითი სიმპტომია თვალის ინფექცია (კონიუნქტივიტი) ან პირის ღრუს, ყელის და ცხვირის წყლულები. გამონაყარის მძიმე ფორმები შეიძლება გადაიზარდოს კანის გავრცელებულ აქერცვლამდე, რაც შეიძლება სიცოცხლისთვის საშიში იყოს. ხშირად კანის ამ ძლიერ გამონაყარს წინ უძღვის თავის ტკივილი, ცხელება, სხეულის ტკივილი (გრიპის მსგავსი სიმპტომები).
თუ გაგივითარდათ ძლიერი გამონაყარი ან კანის ეს გამოვლინებები, არ გამოიყენოთ აკნეტრენტი. შეწყვიტეთ მიღება და დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს.

ფსიქიკური პრობლემები
იშვიათი

- დეპრესია ან დეპრესიასთან დაკავშირებული დარღვევები. ეს დარღვევები მოიცავს სევდას ან განწყობის შეცვლას, შფოთვას, ემოციურ დისკომფორტს.
- არსებული დეპრესიის გაუარესება
- ძალადობრივი ან აგრესიული გამოვლინება

ძალიან იშვიათი

- ზოგიერთ ადამიანს შეიძლება გაუჩნდეს აზრები ან სურვილი, რომ ზიანი მიაყენოს საკუთარ თავს ან დაასრულოს საკუთარი სიცოცხლე (თვითმკვლელობის აზრები),

სცადეთ სიცოცხლის დასრულება (თვითმკვლელობის მცდელობა) ან დაასრულოს სიცოცხლე (თვითმკვლელობა). მათ შეიძლება არ ეტყობოდეთ დეპრესიის ნიშნები.

- უჩვეულო ქცევა
- ფსიქოზის სიმპტომები: რეალობის შეფასების უუნაროობა, როგორიცაა უჩვეულო ხმების გაგება ან საგნების დანახვა

თუ აღგენიშნებათ მითითებული ფსიქიკური და ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის პრობლემები, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს. ექიმმა შეიძლება გითხრათ, რომ შეწყვიტოთ აკნეტრენტის გამოყენება. ეს შეიძლება არ იყოს საკმარისი თქვენი პრობლემების მოსაგვარებლად: შეიძლება დაგჭირდეთ მეტი დახმარება.

ალერგიული რეაქციები
იშვიათი

- მძიმე (ანაფილაქსიური) რეაქციები: სუნთქვისა და ყლაპვის გაძნელება ყელის, სახის, ტუჩების და პირის უეცარი შეშუპებით. ასევე ხელების, ფეხების და ტერფების უეცარი შეშუპება.

ძალიან იშვიათი

- მკერდის უეცარი შებოჭილობა, ქოშინი და ხიხინი, განსაკუთრებით თუ გაქვთ ასთმა.

თუ გაქვთ სერიოზული რეაქცია, დაუყოვნებლივ მიმართეთ სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას.
თუ გაქვთ ალერგიული რეაქცია, შეწყვიტეთ აკნეტრენტის გამოყენება და მიმართეთ ექიმს.

ძვლები და კუნთები
სიმძიმე უცნობია

- პოტენციურად სიცოცხლისთვის საშიში კუნთების სისუსტე, რომელსაც თან ახლავს ხელების და ფეხების მოძრაობის გაძნელება, სხეულის შეშუპება და სისხლჩაქცევები, მუქი შარდი, შარდვის უნარის დაქვეითება ან უუნაროობა, დაბნეულობა ან დეჰიდრატაცია. ეს არის კუნთების დაზიანების ნიშნები, რომელსაც ეწოდება რაბდომიოლიზი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს თირკმლის უკმარისობა. ეს შეიძლება მოხდეს იმ შემთხვევაში, თუ აკნეტრენტის გამოყენებისას მძიმე ფიზიკურ აქტივობას ეწევით.

ღვიძლისა და თირკმელების პრობლემები
ძალიან იშვიათი

- სიყვითლე და კანის ან თვალების დაღლილობის შეგრძნება. ეს სიმპტომები შეიძლება იყოს სიყვითლის (ჰეპატიტის) ნიშანი. დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ აკნეტრენტის გამოყენება და მიმართეთ ექიმს.
- შარდვის გაძნელება, შეშუპებული და დასიებული ქუთუთოები, უკიდურესი დაღლილობის შეგრძნება. ეს შეიძლება იყოს თირკმლის ანთების ნიშნები. დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ აკნეტრენტის გამოყენება და მიმართეთ ექიმს.

ნერვული სისტემის პრობლემები
ძალიან იშვიათი

- მხედველობის დარღვევა, მათ შორის გულისრევა და ღებინება, ასევე მუდმივი თავის ტკივილი და მხედველობის დაბინდვა. ეს შეიძლება იყოს კეთილთვისებიანი ინტრაკრანიალური ჰიპერტენზიის ნიშნები (კეთილთვისებიანი ინტრაკრანიალური წნევის მომატება), განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მიიღება ანტიბიოტიკებთან ერთად, რომელსაც ტეტრაციკლინები ეწოდება. დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ აკნეტრენტის გამოყენება და მიმართეთ ექიმს.

კუჭისა და ნაწლავების პრობლემები
ძალიან იშვიათი

- დიარეა სისხლით ან მის გარეშე, სისხლდენა განავალში და მიმდებარე მიდამოში, მუცლის ძლიერი ტკივილი გულისრევით და ღებინება. ეს შეიძლება იყოს სერიოზული ნაწლავის დაავადებების ნიშნები. დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ აკნეტრენტის გამოყენება და მიმართეთ ექიმს.

თვალის დარღვევები
ძალიან იშვიათი

- ბუნდოვანი ხედვა

თუ აღგენიშნებათ ბუნდოვანი ხედვა, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ აკნეტრენტის გამოყენება და მიმართეთ ექიმს. თუ შეამჩნევთ რაიმე სხვა გავლენას თქვენს მხედველობაზე, აცნობეთ ექიმს რაც შეიძლება მალე.

სხვა გვერდითი მოვლენები:
ძალიან ხშირი

- კანის სიმშრალე, განსაკუთრებით ტუჩებსა და სახეზე; კანის ანთება, ნახეთქები და ტუჩების ანთება, გამონაყარი, მსუბუქი ქავილი და აქერცვლა. მკურნალობის დაწყებიდანვე უნდა გამოიყენოთ დამატენიანებელი კრემი.
- კანი შეიძლება იყოს ჩვეულებრივზე უფრო წითელი და მგრძნობიარე, განსაკუთრებით სახე.
- ზურგის ტკივილი; კუნთების ტკივილი; სახსრების ტკივილი, განსაკუთრებით ბავშვებში და მოზარდებში. შეწყვიტეთ მძიმე ფიზიკური აქტივობა აკნეტრენტით მკურნალობის დროს, რათა თავიდან აიცილოთ ძვლების ან კუნთების პრობლემების გამწვავება.
- თვალის ანთება (კონიუნქტივიტი) და ქუთუთოს მიდამოს ანთება; სიმშრალის და გაღიზიანების შეგრძნება თვალებში. შესაბამისი თვალის წვეთების მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თუ თვალები მშრალი გაქვთ და ატარებთ კონტაქტურ ლინზებს, შესაძლოა დაგჭირდეთ სათვალეების ტარება.
- ღვიძლის ფერმენტების მომატება სისხლის ანალიზში
- სისხლში ცხიმის დონის ცვლილებები (მათ შორის HDL (კარგი ქოლესტერინი) და ტრიგლიცერიდები)
- მსუბუქი სისხლჩაქცევა, სისხლდენა ან შედედება - თუ შედედების უჯრედები დაზიანდა
- ანემია – დაღლილობა, თავბრუსხვევა, კანის ფერმკრთალი – სისხლის წითელი უჯრედების დაზიანებით

ფართოდ გავრცელებული

- თავის ტკივილი

- სისხლში ქოლესტერინის მაღალი დონე
- ცილა ან სისხლი შარდში
- ინფექციებისადმი მომატებული მგრძნობელობა სისხლის თეთრი უჯრედების რაოდენობის შემცირების შედეგად (ნეიტროპენია) –

თუ სისხლის თეთრი უჯრედები დაზიანდა

- ცხვირის სიმშრალე და აქერცვლა, რაც იწვევს ცხვირიდან მსუბუქ სისხლდენას
- ჭრილობა და ანთება ყელისა და ცხვირის არეში
- ალერგიული რეაქციები, როგორიცაა გამონაყარი და ქავილი. თუ გაქვთ ალერგიული რეაქცია, შეწყვიტეთ აკნეტრენტის გამოყენება და მიმართეთ ექიმს.

იშვიათი

- თმის ცვენა (სიმელოტე). ეს არის მხოლოდ დროებითი პერიოდისთვის. მკურნალობის დასრულების შემდეგ თმა კვლავ ამოდის.

ძალიან იშვიათი

- ღამით ხედვის შესუსტება; დალტონიზმი და ფერთა გარჩევის გაუარესება
- სინათლის მიმართ მგრძნობელობა შეიძლება გაიზარდოს; შეიძლება დაგჭირდეთ მზის სათვალეების ტარება, რათა დაიცვათ თვალები ძალიან კაშკაშა მზისგან.
- მხედველობის სხვა პრობლემები, მხედველობის დაბინდვა, მხედველობის დამახინჯება, დაბინდული ზედაპირი თვალზე (რქოვანას დაბინდვა, კატარაქტა).
- გაძლიერებული წყურვილი; ხშირი შარდვის საჭიროება; სისხლის ტესტები აჩვენებს სისხლში შაქრის მატებას. ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს დიაბეტის ნიშანი.
- აკნე შეიძლება გაუარესდეს პირველ კვირებში, მაგრამ სიმპტომები დროთა განმავლობაში უმჯობესდება.
- კანის ანთება, შეშუპება და გამუქება, განსაკუთრებით სახეზე.
- ჭარბი ოფლიანობა ან ქავილი
- ართრიტი; ძვლის დარღვევები (ზრდის შეფერხება, ჭარბი ზრდა და ძვლის სიმკვრივის ცვლილებები); მზარდმა ძვლები შეიძლება შეწყვიტოს ზრდა.
- კალციუმის დეპოზიტები რბილ ქსოვილებში, დაზიანებულ მყესებში, კუნთების დაშლის პროდუქტების მაღალი დონე სისხლში, თუ ენერგიულად ვარჯიშობთ.
- მომატებული მგრძნობელობა სინათლის მიმართ
- ბაქტერიული ინფექციები და ფრჩხილის ცვლილებები
- შეშუპება, გამონადენი
- პოსტოპერაციული ჭრილობის გასქელება
- სხეულზე თმის მატება
- კუნთების ძლიერი შეკუმშვა, სისუსტე, ძილიანობა.
- ლიმფური კვანძები შესაძლოა გადიდდეს. ეს არის სერიოზული გვერდითი ეფექტი. შეიძლება საჭირო გახდეს სასწრაფო სამედიცინო დახმარება.
- ყელის სიმშრალე, ხმის ჩახლეჩა
- სმენასთან დაკავშირებული გართულებები
- ზოგადად ცუდად გრძნობთ თავს
- შარდმჟავას მაღალი დონე სისხლში
- ბაქტერიული ინფექციები

- სისხლძარღვების ანთება (ზოგჯერ სისხლჩაქცევებით და წითელი ლაქებით)

უცნობი

- მუქი შარდი
- ერექციის მიღწევის ან შენარჩუნების პრობლემები
- ლიბიდოს (სექსუალური სურვილის) დაქვეითება

თუ განგივითარდებათ რაიმე გვერდითი მოვლენა, რომელიც არ არის აღნიშნული ამ ინსტრუქციაში, აცნობეთ თქვენს ექიმს ან ფარმაცევტს.

გვერდითი ეფექტების მოხსენება
დაელაპარაკეთ თქვენს ექიმს, ფარმაცევტს ან მედდას ნებისმიერი გვერდითი მოვლენის შემთხვევაში, რომელიც მითითებულია ან არ არის მითითებული წინამდებარე ბროშურაში. ასევე, შეატყობინეთ თურქეთის ფარმაკოვიგილანციის ცენტრს (TÜFAM) დაფიქსირებული გვერდითი ეფექტების შესახებ, დააწკაპუნეთ ბმულზე „წამლის გვერდითი ეფექტების შესახებ შეტყობინება“ www.titck.gov.tr–ზე ან დარეკეთ გვერდითი ეფექტების მოხსენების ხაზზე 0 800 314 00. 08. განვითარებული გვერდითი ეფექტების შეტყობინებით, თქვენ წვლილს შეიტანთ მეტი ინფორმაციის მიღებაში იმ წამლის უსაფრთხოების შესახებ, რომელსაც იყენებთ.

1. აკნეტრენტის® შენახვა
შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას თავდაპირველ შეფუთვაში.
ინახება 25°C-ზე დაბალ ტემპერატურაზე, სინათლისა და ნესტისგან დაცულ ადგილას.

ჭარბი კაფსულები მიაწოდეთ თქვენს ფარმაცევტს.
გამოიყენეთ ვარგისიანობის ვადების შესაბამისად.
არ გამოიყენოთ აკნეტრენტი შეფუთვაზე მითითებული ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ.

არ გადააგდოთ ვადაგასული ან გამოუყენებელი მედიკამენტები! გადაეცით გარემოს დაცვისა და ურბანიზაციის სამინისტროს მიერ განსაზღვრულ ნარჩენების მართვის სისტემას.

ლიცენზიის მფლობელი: Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ç.O.S.B. Karaağaç Mah. Atatürk Cad. No:36 Kapaklı / TEKIRDAĞ
ტელ: 0282 999 16 00

წარმოების ადგილი: Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Akpınar Mahallesi, Osmangazi Cad. No: 156
Sancaktepe / სტამბული

წინამდებარე ინსტრუქცია დამტკიცდა -/--/.