

სახელმძღვანელო ინსტრუქცია

კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი 200 მგ/20 მლ ინტრავენური ინტრავენური საინექციო ხსნარი

იგი ინიშნება ინტრავენურად და ინტრამუსკულურად.
სტერილური

- ***აქტიური ნივთიერება:*** 1 მლ ხსნარი შეიცავს 127065 მგ კალციუმის ფოლინატის პენტაჰიდრატს, რაც უდრის 10 მგ ფოლინის მჟავას. ხსნარის თითოეული 20 მლ ფლაკონი შეიცავს 254,134 მგ კალციუმის ფოლინატის პენტაჰიდრატს, რაც 200 მგ ფოლინის მჟავას ექვივალენტურია.
- ***დამხმარე ნივთიერებები:*** ნატრიუმის ქლორიდი, საინექციო წყალი.

მედიკამენტის გამოყენებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ სახელმძღვანელო ინსტრუქცია, რადგან ის შეიცავს თქვენთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

- *შეინახეთ წინამდებარე მომხმარებლის სახელმძღვანელო. შეიძლება დაგჭირდეთ ხელახლა წაკითხვა.*
- *დამატებითი შეკითხვებით გთხოვთ, მიმართოთ თქვენს ექიმს ან ფარმაცევტს.*
- *ეს წამალი დაგენიშნათ პირადად თქვენ, არ მისცეთ ის სხვებს .*
- *ექიმთან ან საავადმყოფოში მისვლისას აცნობეთ თქვენს ექიმს, რომ ამ მედიკამენტს იყენებთ*
- *ზუსტად დაიცავით წინამდებარე ინსტრუქციაში მოცემული მითითებები. არ გამოიყენოთ მაღალი ან დაბალი დოზები, გარდა იმ დოზისა, რომელიც თქვენთვის არის რეკომენდებული.*

<u>წინამდებარე ინსტრუქცია მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას:</u>

1. რა არის კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი და რისთვის გამოიყენება იგი?

2. რა უნდა იცოდეთ კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკის გამოყენებამდე.

3. როგორ გამოიყენება კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი?

4. რა არის შესაძლო გვერდითი მოვლენები?

5. კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკის შენახვა

1. რა არის კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი და რისთვის გამოიყენება იგი?

კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი 200 მგ/20 მლ არის საინექციო ხსნარი, რომლის აქტიური ნივთიერებაა კალციუმის ფოლინატი.

კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკის ყოველი 20 მლ ფლაკონი შეიცავს 254,134 მგ კალციუმის ფოლინატის პენტაჰიდრატს, რაც ექვივალენტურია 200 მგ ფოლინის მჟავას. ეს არის ღია ფერის გამჭვირვალე ხსნარი. კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი ხელმისაწვდომია 1 ფლაკონის შემცველ მუყაოს კოლოფში.

კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი გამოიყენება შემდეგი მდგომარეობების სამკურნალოდ:

- ფოლიუმის მჟავას დეფიციტის დროს, მეგალობლასტური ანემიის (სისხლის დეფიციტის განსაკუთრებული ტიპი) სამკურნალოდ იმ შემთხვევებში, როდესაც მისი ჩანაცვლება შეუძლებელია, მიუხედავად იმისა, რომ პერორალურად მიიღება.
- ბავშვებში და მოზრდილებში კიბოს მკურნალობის დროს ან მაღალი დოზების დროს ისეთი წამლების ტოქსიკური ეფექტების შემცირების ან პროფილაქტიკისთვის
- გამოიყენება კიბოს სამკურნალოდ 5-ფტორურაცილთან ერთად (კიბოს სხვა წამალი1).

2. რა უნდა იცოლდეთ კალციუმის ფოლინატის-კოჩაკის გამოყენებამდე

კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი არ უნდა შეიყვანოთ ინტრათეკალურად ზურგის სითხეში.

თუ კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი მიღებული უნდა იქნას მეტოტრექსატთან ან 5-ფტორურაცილთან (კიბოს სამკურნალო პრეპარატებთან) ერთად, ის უნდა დაინიშნოს კიბოს მკურნალობაში სპეციალიზებული ექიმის მიერ ან მკაცრი მეთვალყურეობის ქვეშ.

არ გამოიყენოთ კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი შემდეგ სიტუაციებში

- თუ გაქვთ ძლიერი მგრძნობელობა აქტიური ნივთიერების (კალციუმის ფოლინატის) ან მისი რომელიმე სხვა კომპონენტის მიმართ კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკის საინექციო ხსნარში,
- არ გამოიყენოთ კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი, თუ გაქვთ რაიმე სახის ანემია (როგორიცაა პერნიციოზული ანემია), რომელიც გამოწვეულია B12 ვიტამინის დეფიციტით.

კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი სიფრთხილით გამოიყენება შემდეგ სიტუაციებში

- თუ იღებთ ისეთ წამლებს, როგორიცაა ფენობარბიტალი ან ფენიტოინი ეპილეფსიის სამკურნალოდ.
- თუ იყენებთ მას 5-ფტორურაცილთან ერთად კიბოს სამკურნალოდ

- თუ იყენებთ მას კიბოს სამკურნალო საშუალებებთან ერთად, როგორიცაა მეთოტრექსატი
- თუ ხანდაზმული ხართ ან გაქვთ ცუდი ზოგადი მდგომარეობა
- თუ ხართ ორსულობისა და ძუძუთი კვების პერიოდში

თუ ეს მოვლენები აღგენიშნებათ ან აღგენიშნებოდათ თუნდაც წარსულში ნებისმიერ დროს, გთხოვთ, მიმართოთ ექიმს.

კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკის მიღება საკვებთან და სასმელთან ერთად

კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი არ ურთიერთქმედებს საკვებთან და სასმელებთან.

ორსულობა

პრეპარატის გამოყენებამდე გაიარეთ კონსულტაცია ექიმთან ან ფარმაცევტთან.

არ არის ცნობილი, მოქმედებს თუ არა კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი ნაყოფზე ან რეპროდუქციულ შესაძლებლობებზე ორსულობის დროს გამოყენებისას.

კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი არ უნდა იქნას გამოყენებული ორსულობის დროს, თუ ეს აუცილებელია.

ორსულობის დროს კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი უნდა დაინიშნოს იმ შემთხვევებში, როდესაც დედისთვის სარგებელი აღემატება ნაყოფზე შესაძლო მავნე ზემოქმედებას.

თუ კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი უნდა იქნას გამოყენებული 5-ფტორურაცილთან ერთად, არ გამოიყენოთ იგი ორსულობის დროს. არ გამოიყენოთ მეთოტრექსატთან ერთად.

თუ მკურნალობის დროს მიხვდებით, რომ ორსულად ხართ, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს.

ძუძუთი კვება

პრეპარატის გამოყენებამდე გაიარეთ კონსულტაცია ექიმთან ან ფარმაცევტთან.

უცნობია გამოიყოფა თუ არა კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი დედის რძეში. თქვენი ექიმი გადაწყვეტს შეწყვიტოთ თუ არა ძუძუთი კვება ან კალციუმ ფოლინატი-კოჩაკით მკურნალობა.

ავტომანქანებისა და მექანიზმების მართვა

სატრანსპორტო საშუალებების მართვისა და მექანიზმებთან მუშაობის უნარზე გვერდითი ეფექტები არ დაფიქსირებულა.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ზოგიერთი დამხმარე ნივთიერების შესახებ, რომლებსაც შეიცავს კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი

ეს სამკურნალო პროდუქტი შეიცავს 66,8 მგ ნატრიუმს თითოეულ დოზაში (20 მლ). ეს ინფორმაცია მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული პაციენტებისთვის, რომლებიც აკონტროლებენ ნატრიუმის დიეტას.

სხვა პრეპარატებთან ერთად გამოყენება

- კიბოს სამკურნალოდ გამოყენებული მედიკამენტები, როგორიცაა ფტორურაცილი ან სხვა მსგავსი კიბოს საწინააღმდეგო საშუალებები

- ეპილეფსიის სამკურნალოდ გამოყენებული მედიკამენტები, როგორიცაა ფენობარბიტალი, პრიმიდონი და ფენიტოინი

ამ წამლებზე შეიძლება გავლენა იქონიოს კალციუმის ფოლინატმა ან აღნიშნულმა წამლებმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს კალციუმის ფოლინატის მოქმედებაზე. შეიძლება დაგჭირდეთ თქვენი წამლის სხვადასხვა რაოდენობით მიღება, ან შეიძლება დაგჭირდეთ სხვა წამლის მიღება. თქვენი ექიმი გაცნობებთ აღნიშნულის შესახებ.

გთხოვთ, აცნობოთ ექიმს ან ფარმაცევტს ნებისმიერი რეცეპტით ან ურეცეპტოდ გაცემული მედიკამენტის შესახებ, რომელსაც ამჟამად იყენებთ ან იყენებდით.

3. როგორ გამოვიყენოთ კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი?

წამლის სწორი გამოყენებისა და დოზის/ადმინისტრირების ინსტრუქციები:

ექიმი განსაზღვრავს წამლის დოზას თქვენი ავადმყოფობის მიხედვით.

- თქვენი ექიმი გააკეთებს დოზის აუცილებელ კორექციას იატროგენული მეგალობლასტური ანემიისთვის (სისხლის დეფიციტის სპეციფიკური დაავადება), რომელიც ვითარდება ფოლიუმის მჟავას დაბალი დიეტის, ხშირი სისხლის აღების ან ხშირი ჰემოდიალიზის გამო.
- თუ კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი დაგენიშნათ ანტიფოლინის (ტრიმეტრექსატი, ტრიმეტოპრიმი, პირიმეტამინი, მეთოტრექსატი) მავნე ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად, ექიმი დაგირეგულირებთ მედიკამენტის დოზას სხვა წამლის დოზის მიხედვით, რომელსაც იღებთ.
- 5-ფტორურაცილთან ერთად გამოყენებისას. კალციუმის ფოლინატის შემდეგ ინიშნება 5-ფტორურაცილი. თქვენი ექიმი დაადგენს რამდენ ციკლს და რამდენ კალციუმის ფოლინატ-კოჩაკს და 5-ფტორურაცილს მიიღებთ.

შეყვანის გზა და მეთოდი:

კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი განკუთვნილია კუნთში(ინტრამუსკულარული) ან ვენაში (ინტრავენური) შეყვანისთვის და უნდა გაკეთდეს ასეთი პრეპარატების მიღების გამოცდილების მქონე პირების მიერ. არ შეიყვანოთ ზურგის სითხეში (ინტრათეკალური).

სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფი

სხვა პრეპარატებთან ერთად მიღება:

გამოყენება ბავშვებში:

კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკის დიდმა რაოდენობამ შეიძლება გაზარდოს ციკლაგუსის კრუნჩხვები პაციენტებში ზოგიერთი ეპილეფსიის საწინააღმდეგო პრეპარატის ეფექტის შემცირებით. ბავშვებში და 18 წლამდე ასაკის პრაქტიკის შესახებ მონაცემები არასაკმარისია.

გამოყენება ხანდაზმულებში:

კლინიკურმა მონაცემებმა აჩვენა, რომ არ იყო მნიშვნელოვანი განსხვავება კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკით მკურნალობის დროს ახალგაზრდა და ხანდაზმულ პაციენტებს შორის. მძიმე კუჭ-ნაწლავის ტოქსიკურობის განვითარების რისკი უფრო მაღალია ხანდაზმულ და

ცუდ ფიზიკურ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტებში. იმის გათვალისწინებით, რომ ხანდაზმულ პაციენტებს ასევე აქვთ თირკმელების ფუნქციის დარღვევა, საჭიროა დოზის უფრო ფრთხილად კორექტირება და თირკმლის ფუნქციის მონიტორინგი.

სპეციალური გამოყენების შემთხვევები:

თირკმლის უკმარისობა: ვინაიდან თირკმლის უკმარისობა იწვევს მეთოტრექსატის გამოყოფის შეფერხებას, თუ კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი გამოიყენება მეთოტრექსატის მავნე ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად, შესაძლოა საჭირო გახდეს კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკის დოზის გაზრდა ან მიღების პერიოდის გახანგრძლივება. იმის გამო, რომ კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი გამოიყოფა თირკმელებით, არასასურველი ეფექტების რისკი შეიძლება გაიზარდოს თირკმლის უკმარისობის მქონე პაციენტებში.

ღვიძლის უკმარისობა:

არ არის საკმარისი ინფორმაცია.

თუ ფიქრობთ, რომ კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკის ეფექტი ძალიან ძლიერი ან სუსტია, მიმართეთ თქვენს ექიმს ან ფარმაცევტს.

თუ კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკის საჭიროზე დიდ დოზას მიიღებთ:

კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკის საჭიროზე დიდი დოზის მიღების შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს.

დოზის გადაჭარბებამ შეიძლება გამოიწვიოს შესაძლო ალერგიული რეაქციები და გააუქმოს ანტიფოლინის (ფოლიუმის მჟავას ანტაგონისტები) ან ეპილეფსიური საშუალებების (ანტიეპილეფსიური) ეფექტი.

თუ დაგავიწყდათ კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკის გამოყენება

არ მიიღოთ ორმაგი დოზა გამოტოვებული დოზის ასანაზღაურებლად.

თქვენი ექიმი გადაწყვეტს როდის დანიშნოს გამოტოვებული დოზა.

მნიშვნელოვანია დაიცვათ თქვენი ექიმის ინსტრუქციები შემდეგი დოზის მიღებისთვის.

შესაძლო ეფექტები კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკით მკურნალობის შეწყვეტისას

არ შეწყვიტოთ მკურნალობა, თუ ექიმის დანიშნულება არ არის.

თუ გაქვთ დამატებითი შეკითხვები ამ პროდუქტის გამოყენებასთან დაკავშირებით, მიმართეთ თქვენს ექიმს ან ფარმაცევტს.

4. რა არის შესაძლო გვერდითი მოვლენები?
ყველა მედიკამენტის მსგავსად, კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკის შემადგენლობაში შემავალი ნივთიერების მიმართ მგრძნობიარე ადამიანებში შეიძლება აღინიშნოს მყისიერი ეფექტი.

თუ ჩამოთვლილთაგან რომელიმე აღგენიშნათ, შეწყვიტეთ კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკის გამოყენება და დაუყოვნებლივ აცნობეთ ექიმს ან დაუკავშირდით უახლოესი საავადმყოფოს სასწრაფო დახმარების განყოფილებას:

- მძიმე ალერგიული რეაქცია (ეფექტები, რომლებიც შეიძლება განვითარდეს ალერგიის შედეგად, როგორიცაა სიწითლე, ხელების, ფეხების, ტერფების, სახის, ტუჩების, პირის ღრუს ან ყელის შეშუპება, დაღლილობის შეგრძნება)

ეს ყველაფერი ძალიან სერიოზული გვერდითი მოვლენებია.
თუ გაქვთ ასეთი მოვლენა, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ გაქვთ სერიოზული ალერგია კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკის მიმართ.
შეიძლება დაგჭირდეთ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება ან ჰოსპიტალიზაცია.
ყველა ეს ძალიან სერიოზული გვერდითი მოვლენა ძალზე იშვიათია.
გვერდითი მოვლენები ჩამოთვლილია შემდეგ კატეგორიებში მათი გამოვლენის სიხშირის მიხედვით:

ძალიან ხშირი: შეიძლება განვითარდეს 10-დან 1 პაციენტში მაინც.
ხშირი: 1-ზე ნაკლები 10 პაციენტიდან, მაგრამ 1-ზე მეტი 100 პაციენტში.
ნაკლებად ხშირი: 1-ზე ნაკლები 100 პაციენტში, მაგრამ 1-ზე მეტი 1000 პაციენტში.
იშვიათი: 1-ზე ნაკლები 1000 პაციენტში.
ძალიან იშვიათი: 1-ზე ნაკლები 10000 პაციენტიდან.
უცნობია: არ შეიძლება შეფასდეს არსებული მონაცემებით.

ძალიან ხშირი გვერდითი მოვლენები

- მძიმე გულისრევა, ღებინება, დიარეა, წყლის დაკარგვა (განსაკუთრებით შეინიშნება კალციუმის ფოლინატის და 5-ფტორურაცილის ერთად გამოყენებისას)
- მძიმე ეფექტები, მათ შორის პირის ღრუს წყლულები, პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის ანთება და ტუჩის ანთება, აღინიშნება კალციუმის ფოლინატის და 5-ფტორურაცილის ერთად გამოყენებისას.

ნაკლებად ხშირი გვერდითი მოვლენები

- წვა

იშვიათი გვერდითი მოვლენები

- უძილობა, გაღიზიანებადობა, დეპრესია
- გაძლიერებული ეპილეფსიური კრუნჩხვები, კრუნჩხვები და/ან სისუსტე
- კუჭ-ნაწლავის დარღვევები

ძალიან იშვიათი გვერდითი მოვლენები

- ალერგიული რეაქციები შოკის ჩათვლით

უცნობი

- ალერგიული რეაქციები, ჭინჭრის ციება
- ფერმენტის დეფიციტი შარდოვანას სინთეზში (ჰიპერმონემია) კალციუმის ფოლინატთან და 5-ფტორურაცილთან ერთად გამოყენებისას
- ხელებისა და ფეხების დარღვევები (პალმარ-პლანტარული ერითროდისესთეზია) კალციუმის ფოლინატთან და 5-ფტორურაცილთან ერთად გამოყენებისას

იყო შემთხვევები, როდესაც დაფიქსირდა დაუყოვნებელი ეფექტები (როგორიცაა სტივენს-ჯონსონის სინდრომი და ტოქსიკური ეპიდერმული ნეკროლიზი), რომელთაგან ზოგიერთი ფატალური იყო კალციუმის ფოლინატის და ამ გვერდითი

ეფექტებთან დაკავშირებული სხვა პრეპარატების ერთად გამოყენებისას. შესაძლებელია, რომ კალციუმის ფოლინატმა განაპირობა აღნიშნული შედეგი.
თუ აღგენიშნებათ რაიმე გვერდითი მოვლენა, რომელიც არ არის მითითებული წინამდებარე ინსტრუქციაში, აცნობეთ თქვენს ექიმს ან ფარმაცევტს.

<u>გვერდითი ეფექტების მოხსენება</u>

დაელაპარაკეთ თქვენს ექიმს, ფარმაცევტს ან მედდას ნებისმიერი გვერდითი მოვლენის შემთხვევაში, რომელიც მითითებულია ან არ არის მითითებული წინამდებარე ინსტრუქციაში. ასევე, შეატყობინეთ ეფექტების შესახებ თურქეთის ფარმაკოვიგილანციის ცენტრს (TÜFAM) „წამლის გვერდითი ეფექტების შესახებ შეტყობინება“ ბმულზე გადასვლით www.titck.gov.tr–ზე ან დარეკეთ გვერდითი ეფექტების მოხსენების ხაზზე 0 800 314 00 08. წარმოქმნილი გვერდითი ეფექტების შეტყობინებით, თქვენ წვლილს შეიტანთ მეტი ინფორმაციის მიღებაში იმ წამლის უსაფრთხოების შესახებ, რომელსაც იყენებთ.

5. კალციუმის ფოლინატის-კოჩაკის შენახვა

კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას მისსავე შეფუთვაში.

კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი ინახება 2-8°C ტემპერატურაზე (მაცივარში) ორიგინალურ შეფუთვაში, სინათლისაგან დაცულ ადგილას.

კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი უნდა იქნას გამოყენებული დაუყოვნებლივ აღდგენის შემდეგ. დაუყონებლივ არგამოყენების შემთხვევაში, მისი შენახვა შესაძლებელია 2-8°C ტემპერატურაზე (მაცივარში) მაქსიმუმ 24 საათის განმავლობაში.

გამოიყენეთ ვარგისიანობის ვადების შესაბამისად.

არ გამოიყენოთ კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი შეფუთვაზე მითითებული ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ.

არ გამოიყენოთ კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი, თუ შეამჩნევთ რაიმე დეფექტს პროდუქტში ან/და მის შეფუთვაში.

არ გადააგდოთ ვადაგასული ან გამოუყენებელი მედიკამენტები! გადაეცით გარემოს დაცვისა და ურბანიზაციის სამინისტროს მიერ განსაზღვრულ ნარჩენების მართვის სისტემას.

ლიცენზიის მფლობელი:

KOÇAKFARMA ilaç ve Kimya Sanayi A.$.

Mahmutbey Mah. 2477. Sok. No:23

Bagcilar/istanbul

წარმოების ადგილი:

KOÇAKFARMA llaç ve Kimya Sanayi A.S.

Cerkezköy Organize Sanayi Bölgesi,

Karaaga¢ Mah. 11. Sok. No:5

Kapakli / Tekirdag

შემდეგი ინფორმაცია განკუთვნილია ჯანდაცვის პერსონალისთვის, რათა სათანადოდ გამოიყენონ ეს წამალი

გამოუყენებელი პროდუქტები ან მასალები უნდა განადგურდეს "სამედიცინო ნარჩენების კონტროლის დებულების" და "შეფუთვისა და შეფუთვის ნარჩენების კონტროლის წესების" შესაბამისად.

მომზადების ინსტრუქცია:

კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი გამოყენებამდე ვიზუალურად უნდა შემოწმდეს. საინექციო ან საინფუზიო ხსნარი უნდა იყოს გამჭვირვალე მოყვითალო ფერის. თუ ხსნარი ამღვრეულია ან შეინიშნება ნაწილაკები, ხსნარი უნდა განადგურდეს. საინექციო ან გამოუყენებელი და ნარჩენი ხსნარი უნდა განადგურდეს.

კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი შეჰყავთ კუნთში ან ინტრავენურად (ბოლუსი ან პერფუზია). ინტრავენურად შეყვანისას ხსნარი არ უნდა მიეცეს წუთში 160 მგ-ზე მაღალი დოზებით კალციუმის შემცველობის გამო.

კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი შეიძლება განზავდეს 5% გლუკოზით ან 0,9% ნატრიუმის ქლორიდით ინტრავენური პერფუზიისთვის.

არ უნდა იქნას გამოყენებული ინტრათეკულურად.

შეუთავსებლობა:

დაფიქსირდა შეუთავსებლობა კალციუმის ფოლინატის საინექციო ფორმასა და დროპერიდოლის, ფტორურაცილის, ფოსკარნეტინისა და მეტოტრექსატის საინექციო ფორმებს შორის.

დროპერიდოლი:

როდესაც დროპერიდოლი 1,25 მგ/0,5 მლ პირდაპირ ურევენ 5 მგ/0,5 მლ კალციუმის ფოლინატს შპრიცში, წარმოიქმნება ნალექი 25°C ტემპერატურაზე 5 წუთში, რასაც მოჰყვება სრული ნალექი ცენტრიფუგაციით 8 წუთის განმავლობაში.

უეცარი ნალექის წარმოქმნა შეინიშნება Y ჯგუფში 1,25 მგ/0,5 მლ დროპერიდოლის და 5 მგ/0,5 მლ კალციუმის ფოლინატის თანმიმდევრული მიღების შემდეგ Y მხარის ჰაერით გაწმენდის გარეშე.

5-ფტორურაცილი:

კალციუმის ფოლინატი და 5-ფტორურაცილი არ უნდა იყოს შერეული ერთსა და იმავე ინფუზიაში, რადგან შეიძლება წარმოიქმნას ნალექი. ნაჩვენებია, რომ 50 მგ/მლ ფტორურაცილი და 20 მგ/მლ კალციუმის ფოლინატინი შეუთავსებელია სხვადასხვა რაოდენობით წყალში 5% დექსტროზის შემცველობით ან მის გარეშე და შენახვისას პოლივინილ ქლორიდის კონტეინერებში 4°C, 23°C ან 32°C ტემპერატურაზე.

სხვა ნარევებზე დასკვნები არ არსებობს, თუმცა საინექციო/საინფუზიო კალციუმის ფოლინატი-კოჩაკი არ უნდა აგვერიოს სხვა პრეპარატებთან, როგორიცაა ოქსალიპლატინი ან ირინოტეკანი.

ფოსკარნეტი:

ცნობილია, რომ ფოსკარნეტი 24 მგ/მლ წარმოქმნის მღვრიე ყვითელ ხსნარს 20 მგ/მლ კალციუმის ფოლინატთან შერევისას.